


AC14 *Sarcinochrysis marina*

Taxonomie		Image		Origine	
Règne	Chromista			Zone climatique	Tempérée
Division	Heterokontophyta			Habitat	Côtier
Classe	Pelagophyceae			Océan	Atlantique Nord
Ordre	Sarcinochrysidales			Mer	Manche
Famille	<i>Sarcinochrysidaceae</i>			Pays	France
Genre	<i>Sarcinochrysis</i>			Région	Basse-Normandie
Espèce	marina			Géolocalisation	
Autorité(s)	Geitler			Latitude	49.319
				Longitude	-0.347000
Identité		Morphologie		Culture	
Holotype	Non	Longueur (µm)	6-7 µm	Isolée par	H. Lepailleur
Code équivalent	-	Largeur (µm)	4-5 µm	Date d'isolement	1965
Déposée par	-	Diamètre	-	Site d'isolement	Luc sur Mer
Date de dépôt	-	Paroi	-	Milieu de culture	ES
Identifiée par	-	Commentaires	CB: formes observées: état palmelloide "sarcinochrysoïde"; zoïdes; souches anciennes -> état palmelloide identique à <i>Ruttnera chadefaudii</i> .	Température de conservation actuelle	16 °C
				Lumière de conservation actuelle	70 µE
				Toxicité	Non démontrée
Liens externes					
Numéro d'accès Genbank	-				
Références	- Gayral P. (1972). Sur les Chrysophycées à zoïdes phéophycéens, notamment <i>Sarcinochrysis marina</i> Geitler. Soc. Phycol de France, Bull 17: 40-45.				