

AC265 *Heterosigma akashiwo*

Taxonomie		Image	Origine		
Règne	Chromista		Zone climatique	Tempérée	
Division	Heterokontophyta		Habitat	Côtier	
Classe	Raphidophyceae		Océan	-	
Ordre	Chattonellales		Mer	-	
Famille	<i>Chattonellaceae</i>		Pays	France	
Genre	<i>Heterosigma</i>		Région	-	
Espèce	akashiwo		Géolocalisation		
Autorité(s)	(Hada) Sournia		Latitude	46.138	
		Longitude	-1.191000		
Identité		Morphologie	Culture		
Holotype	Non	Longueur (µm)	-	Isolée par	J. Fresnel
Code équivalent	-	Largeur (µm)	-	Date d'isolement	1992
Déposée par	-	Diamètre	-	Site d'isolement	Baie de La Rochelle
Date de dépôt	-	Paroi	-	Milieu de culture	K/2
Identifiée par	-	Commentaires	Cellule flagellée à 2 fouets latéraux inégaux, nombreux plastes lenticulaires jaune-brun, périplaste pustuleux, nage caractéristique par rotation, avec migrations dans l'erien au cours de la journée		
			Température de conservation actuelle	16 °C	
			Lumière de conservation actuelle	130 µE	
			Toxicité	Non démontrée	
Liens externes					
Numéro d'accès Genbank	-				
Références	-				