


AC48 *Pleurochrysis roscoffensis*

Taxonomie		Image		Origine	
Règne	Chromista			Zone climatique	Tempérée
Division	Haptophyta			Habitat	Côtier
Classe	Prymnesiophyceae			Océan	Atlantique Nord
Ordre	Coccolithales			Mer	Manche
Famille	<i>Pleurochrysidaceae</i>			Pays	France
Genre	<i>Pleurochrysis</i>			Région	Basse-Normandie
Espèce	roscoffensis			Géolocalisation	
Autorité(s)	-			Latitude	-
Identité		Morphologie		Culture	
Holotype	Non	Longueur (µm)	-	Isolée par	J. Fresnel
Code équivalent	-	Largeur (µm)	-	Date d'isolement	1979
Déposée par	-	Diamètre	-	Site d'isolement	Courseulles-sur-mer
Date de dépôt	-	Paroi	Coccosphère	Milieu de culture	f/2
Identifiée par	-	Commentaires	CB: cellules flagellées solitaires toujours à cricolithes. 2 longs flagelles; sexualité démontrée avec alternation de générations. Collectée dans un bassin à huîtres.	Température de conservation actuelle	16 °C
				Lumière de conservation actuelle	130 µE
				Toxicité	Non démontrée

AC48 *Pleurochrysis roscoffensis*

Liens externes

Numéro d'accès Genbank

-

Références

- Gayral P, Fresnel J. (1983) Description, sexualité et cycle de développement d'une nouvelle coccolithophoracée (Prymnesiophyceae) : *Pleurochrysis pseudoroscoffensis* sp. nov. *Protistologica* XIX (2) : 245-261
- Bittner L, Gobet A, Audic S, Romac S, Egge E.S., Santini S, Ogata H, Probert I, Edvardsen B and de Vargas C (2012) Diversity patterns of uncultured Haptophytes unravelled by pyrosequencing in Naples Bay. *Molecular Ecology* DOI: 10.1111/mec.12108